

2019年10月2日

各 位

会 社 名 東邦ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役会長 CEO 濱田 矩男 (コード番号 8129 東証第一部) 問合せ先 取締役 広報・IR 室長 河村 真 (電話 03-6838-2803)

共創未来ファーマにおけるカンデサルタン錠 2mg/4mg/8mg/12mg「FFP」の 用法及び用量の一部変更承認取得に関するお知らせ

東邦ホールディングス株式会社(本社:東京都、代表取締役会長 CEO:濱田 矩男)の 医薬品製造販売事業完全子会社である共創未来ファーマ株式会社(本社:東京都、代表取締 役社長:有働 敦)が、10月2日にカンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg「FFP」の用法 及び用量にかかる一部変更承認を取得いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

## カンデサルタン錠 2mg/4mg/8mg/12mg「FFP」の概要

薬効分類名	販売名	同一成分薬
持続性アンジオテンシンⅡ受容体 拮抗剤	カンデサルタン錠 2mg「FFP」 カンデサルタン錠 4mg「FFP」 カンデサルタン錠 8mg「FFP」 カンデサルタン錠 12mg「FFP」	ブロプレス錠 2 ブロプレス錠 4 ブロプレス錠 8 ブロプレス錠 12

## カンデサルタン錠 2mg/4mg/8mg/12mg「FFP」の用法及び用量にかかる改訂の概要

効能又は効果	用法及び用量
[錠 2mg/4mg/8mg/12mg] 高血圧症	成人 通常、成人には 1 日 1 回カンデサルタンシレキセチルとして 4~8mg を経口投与し、必要に応じ 12mg まで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、1 日 1 回 2mg から投与を開始し、必要に応じ 8mg まで増量する。 小児 通常、1歳以上 6歳未満の小児には1 日 1 回カンデサルタンシレキセチルとして 0.05~0.3mg/kg を経口投与する。 通常、6歳以上の小児には1 日 1 回カンデサルタンシレキセチルとして 2~8mg を経口投与し、必要に応じ 12mg まで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、低用量から投与を開始し、必要に応じて 8mg まで増量する。
[錠 2mg/4mg/8mg/12mg] 腎実質性高血圧症	通常、成人には1日1回カンデサルタンシレキセチルとして2mgから経口投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。
[錠 2mg/4mg/8mg] 下記の状態で、アンジオテンシン 変換酵素阻害剤の投与が適切で ない場合 慢性心不全(軽症~中等症)	通常、成人には1日1回カンデサルタンシレキセチルとして 4mg から経口投与を開始し、必要に応じ 8mg まで増量できる。なお、原則として、アンジオテンシン変換酵素阻害剤以外による基礎治療 は継続すること。

(下線部:改訂箇所)

以 上